

ฟอลครอป เซต

กลุ่มสาร :

ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ธาตุอาหารรอง

ไนโตรเจน (N)	3%
ฟอสฟอรัส (P_2O_5)	7%
โพแทสเซียม (K_2O)	10%

ธาตุอาหารเสริม

โบรอน (B)	1%
โมลิบดีนัม (Mo)	0.1%

ขนาดบรรจุ



12x1 ลิตร



4x5 ลิตร



คุณสมบัติ

ในระยะออกดอก-ติดผล ช่วยให้พืชต้านทานสภาวะเครียด เพิ่มปริมาณ osmolyte ภายในเซลล์ พืชสามารถปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ช่วยให้พืชมีความสามารถในการรักษาน้ำภายในเซลล์ และฟื้นตัวได้ดีจากสภาวะเครียดจากความแห้งแล้ง

คุณประโยชน์

- ช่วยให้พืชแตกแขนงได้อย่างสม่ำเสมอพร้อมๆกัน ช่วยแตกตาดอก เพิ่มจำนวนดอก
- เพิ่มการติดผลและการเจริญเติบโตของผล ลดการหลุดร่วงเพิ่มคุณภาพผลผลิต
- ฟื้นฟูสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยว แก้ปัญหาดินโทรม
- ช่วยเพิ่มความต้านทานในพืชต่อสภาวะเครียด จากอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด

วิธีการใช้



ดูจากตาราง

พืช



- กุเรียน • ไม้ผล
- ข้าว • ผักต่างๆ
- พืชทุกชนิด



ทุเรียนระยะดอก



ทุเรียนระยะโผล่ทรงกระถา

พืช	ประโยชน์	อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร	ช่วงเวลาการใช้
ข้าว	<ul style="list-style-type: none"> - โยเซียวเข้ม รากสมบูรณ์ - ต้นแกร่ง ไม่ล้มง่าย - เมล็ดเต่ง รวงดอก น้ำหนักดี 	30 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากหว่านปุ๋ยครั้งแรก - ก่อนออกรวง ระยะตั้งท้อง - หลังออกรวง
ทุเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นฟูสภาพดิน ทำให้มีการแตกใบอ่อนอย่างรวดเร็ว - ช่วยให้เกิดตาดอก มีปริมาณดอกมาก - ขยายผล ผลโต ได้มาตรฐาน รูปทรงดี 	30 มิลลิลิตร 50 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากใส่ปุ๋ยทางดิน 10-15 วัน ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง - เมื่อตรวจพบระยะไข่ปลา ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง - หลังจากติดผลอ่อน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
ลำไย มะม่วง เงาะ มังคุด ชมพู่ ลิ้นจี่	<ul style="list-style-type: none"> - พืชต้นเร็ว มีการแตกใบอ่อนอย่างสม่ำเสมอ - ช่วยให้มีการแตกตาดอกอย่างสมบูรณ์ - ขยายขนาดของผล 	30 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากใส่ปุ๋ยทางดิน 10-15 วัน ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง - หลังจากพืชออกดอก ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง - หลังจากติดผลอ่อน ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
ส้ม มะนาว	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยให้มีการแตกตาดอก - ติดผล ขยายขนาดของผล 	30 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - หลังจากขึ้นน้ำแล้ว 1-2 วัน ฉีดพ่นทางใบ 2-3 ครั้ง - ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน - ระยะติดผลอ่อน (ขนาดเมล็ดเท่าหัวเขี้ยว)
พืชผัก พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยในการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบูรณ์ของต้น ติดดอก ติดผลดี 	30 มิลลิลิตร	<ul style="list-style-type: none"> - ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน