

ชื่อสามัญ :

อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb 30% WG)

กลุ่มสารเคมี :

Oxadiazine

กลุ่มสารตาม  
IRAC

22A

ขนาดบรรจุ



30x100 กรัม



## กลไกการออกฤทธิ์

ออกฤทธิ์ตรงระบบประสาท (Nerve action) ตรง axon (Axonic transmission) โดยปิดทางเข้าออกของโซเดียม คล้ายกับกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ที่สารเคมีจะทำปฏิกิริยากับผนังชั้นนอกของเซลล์ประสาท ทำให้การเข้าออกของ โซเดียมไอออนไม่สมดุล

## คุณสมบัติ

กำจัดหนอนที่เกิดจากผีเสื้อ เช่น หนอนม้วนใบข้าว หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม

## คุณประโยชน์

ใช้สลับกับสารกำจัดแมลงกลุ่มอื่นได้ เพื่อป้องกันการดื้อยา เป็นพืชต่ำ ต่อแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ แมลงเต่าทอง แมงมุม

## คำแนะนำ

ควรผสมเบสมอร์ด้วยทุกครั้ง จะทำให้ สารแทรกซึมเข้าสู่ใบพืชได้เร็วขึ้น เมื่อ หนอนกินสารเข้าไปจะเป็นอัมพาต และ หยุดกินอาหาร จะตายภายใน 1-3 วัน ฟันในระยะฟักออกดอกได้

วิธีการใช้



สาร



5-10 กรัม ผสม

น้ำ



20 ลิตร

พืช



- กุเรียน
- ลำไย
- ข้าว
- มะเขือเทศ
- หอม กระเทียม
- ไม้ผลและผักต่างๆ



หนอนเจาะมะลฤเรียน



หนอนคืบกินดอกลำไย



หนอนคืบกินใบ

พืช	ศัตรูพืช	อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร	วิธีใช้
ทุเรียน	หนอนเจาะผล หนอนเจาะดอก หนอนคืบ	5-10 กรัม	พ่นเมื่อเริ่มพบการทำลายของหนอน
ข้าว	หนอนท้อใบข้าว	10-15 กรัม	
หอม กระเทียม	หนอนกระทุ้หอม หนอนกระทุ้ผัก	10-15 กรัม	
มะเขือเทศ	หนอนกระทุ้ผัก	5-10 กรัม	