

โมแซก®

ชื่อสามัญ :

อะบาเมกติน (abamectin 1.8% EC)

กลุ่มสารเคมี :

Avermectin

กลุ่มสารตาม
IRAC

6

ขนาดบรรจุ



30x100 มิลลิลิตร

12x500 มิลลิลิตร

12x1,000 มิลลิลิตร



20 ลิตร

200 ลิตร



กลไกการออกฤทธิ์

สารจะเข้าไปกระตุ้นให้แมลงปล่อยกรดอะมิโนชื่อ Y-aminobutyric acid มีผลต่อการยับยั้งการทำงานของระบบประสาท

คุณสมบัติ

เป็นสารที่ได้จากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ชื่อ *Streptomyces avermills* ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและกินตาย การดูดซึมจำกัด แต่ไม่มีการเคลื่อนย้ายในพืช

คุณสมบัติ

กำจัดได้ทั้งแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหรีวขาว แมลงปากกัด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ผัก และไรขาวพริก

คำแนะนำ

1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงดอกบาน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถใช้ร่วมกับแมงเกอร์ อีการ์ ชาโจ

สารกำจัดแมลง หน้า 5, 7, 12

อัตราการใช้



สาร



30

มิลลิลิตร

ผสม



น้ำ

20 ลิตร

พืช



พืชไร่ ผัก ไม้ผล
และไม้ดอก



เพลี้ยไฟในพริก

| พืช | แมลง | อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร | วิธีใช้ |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| ทุเรียน | หนอน เพลี้ยไฟ ไรต่างๆ | 30-40 มิลลิลิตร | เมื่อเริ่มพบการระบาด |
| ส้ม | เพลี้ยไฟ หนอนซอนโบ | 30-50 มิลลิลิตร | |
| พืชตระกูลแตง | หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนซอนโบ | | |
| พริก | ไรขาว | 50 มิลลิลิตร | |