

ชีเออร์®

ชื่อสามัญ :

เพรทิลาคอร์ (pretilachlor 30% EC)

กลุ่มสารเคมี :

Chloroacetamide

กลุ่มสารตาม
HRAC

K3

ขนาดบรรจุ



12x1 ลิตร



กลไกการออกฤทธิ์

เข้าไปยับยั้งการแบ่งเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของวัชพืช กลุ่มยับยั้งจุดเจริญบริเวณยอด

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลายในกลุ่ม chloroacetamide มีฤทธิ์ดูดซึมเข้าทำลายยอดอ่อนของวัชพืชที่เพิ่งงอก ใช้ก่อนวัชพืชงอกหรือวัชพืชเริ่มงอก ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่หักงิ ไม่แดง ไม่งัน พ่นได้ทั้งนาที่ตอและนาที่ลุ่ม

คุณสมบัติ

กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หม่อนข้าว และหม่อนดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชตระกูลกก เช่น กขหนา กขทราย และหนวดปลาชุก

คำแนะนำ

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence)
ในช่วงนาหว่านน้ำตม พ่นระยะ 0-4 วัน
หลังหว่านข้าว

อัตราการใช้



สาร 300-400
มิลลิลิตร



75-100
มิลลิลิตร

ผสม น้ำ



60-80
ลิตร

15-20
ลิตร



พื้นที่ 1 ไร่

พื้นที่ 1 งาน

พืช



• ข้าว

หลังหว่านข้าว 0-4 วัน และรดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน