

บิวต้า-โปร®

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์+โพรพานิล (butachlor+propanil) 35+35% W/V EC

กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide + Amide

กลุ่มสารตาม
HRAC

K3+C2


ขนาดบรรจุ



12x1 ลิตร



กกขนาก



หญ้าดอกขาว



หญ้าข้าวแค้น

กลไกการออกฤทธิ์

บิวทาคลอร์จะยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน ทำให้ใบบิดเบี้ยวห่อม้วนหนา เส้นใบสั้นและเป็นรอยย่น ส่วนโพรพานิล เป็นสารกำจัดวัชพืชที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายอิลิกตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้ใบพืชแสดงอาการ เหลืองและตายในที่สุด

คุณสมบัติ

เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม เข้าทางยอดอ่อนและทางราก ใช้พ่นหลังวัชพืชงอก หรือวัชพืชมีใบจริง 2-3 ใบ

คุณประโยชน์

ใช้ในนาหว่านน้ำตม กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนากและหนวดปลาดุก

คำแนะนำ

1. ขณะพ่นหน้าดินที่มีความชื้น
2. จะมีประสิทธิภาพดีกว่าหน้าดินแห้ง ระวังช่วงไขน้ำเข้าแปลงหลังพ่นสาร อย่านำน้ำท่วมยอดข้าว

อัตราการใช้



สาร 250-300 มิลลิลิตร



65-75 มิลลิลิตร

ผสม น้ำ



60-80 ลิตร

15-20 ลิตร



พื้นที่ 1 ไร่

พื้นที่ 1 งาน



• ข้าว

ที่อายุข้าว 7-10 วันหลังหว่าน ก่อนพ่นสารต้องระบายน้ำ ออกจากนา และกดน้ำเข้านาหลังพ่นสารแล้ว 2-3 วัน