

ซาโจ

ชื่อสามัญ :

คลอร์ฟีนาพอร์ (chlorfenapyr 10% SC)

กลุ่มสารเคมี :

(Chemical group) : Arylpyrrole


กลุ่มสารตาม
IRAC

13

ขนาดบรรจุ



30x100 มิลลิลิตร
24x500 มิลลิลิตร
12x1,000 มิลลิลิตร



20 ลิตร



หนอนกอข้าว (ตัวเต็มวัย)



อาการโดนหนอนกอข้าว

กลไกการออกฤทธิ์

Chlorfenapyr ขัดขวางการส่งผ่านอิเล็กตรอนในกระบวนการสร้างพลังงาน (Oxidative phosphorylation) ใน mitochondria ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์พลังงาน ATP ได้เมื่อร่างกายของแมลงไม่สามารถสังเคราะห์ ATP ได้จึงทำให้ขาดพลังงาน เซลล์จึงไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ และแมลงจึงตายในที่สุด

คุณสมบัติ

ออกฤทธิ์สองทาง ทั้งถูกตัวตายและกินตาย ออกฤทธิ์เร็ว แมลงเป็นอัมพาตภายใน 1-3 ชั่วโมง ตายภายใน 1-2 วัน ปลอดภัยต่อดอกไม้ กัดหนวล ไม่ระคายเคืองและไม่มีกลิ่นฉุน

คุณประโยชน์

กำจัดหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะดอก หนอนม้วนใบ หนอนกอ หนอนเจาะผล หนอนคืบ เพลี้ยไฟ ไรแดง

คำแนะนำ

สามารถใช้ช่วงมีดอกได้
และใช้โดรนในการฉีดพ่นได้
ห้ามใช้ในมะละกอ

อัตราการใช้



สาร



30-50
มิลลิลิตร

ผสม

น้ำ



20 ลิตร

พืช



- ข้าว
- ข้าวโพด
- ผัก
- ส้ม
- ทุเรียน